

Alert.seattle.gov/boilwater(ຕົ້ມນໍ້າ)

ຄວາມຈິງ: Seattle Public Utilities (SPU) ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງປະກາດໃຫ້ຕົ້ມນໍ້າໃນບາງເຂດຂອງເມືອງ ຊີອາດໂຕ້. ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກກະທົບ ຈົ່ງຕົ້ມນໍ້າກ່ອນຈະໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນໂຣກພັຍໄຂ້ເຈັບແລະບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ.

ຄໍາເຕືອນນີ້ມີຜົນປະກາດໃຊ້ຈົນກ່ວາຈະມີຜົນກວດສອບນໍ້າອອກມາວ່າ ນໍ້ານັ້ນປອດພັຍທີ່ຈະດື່ມໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ:

ໃນລະຫວ່າງການປະກາດເຕືອນໃຫ້ຕົ້ມນໍ້າ:

- ຫ້າມດື່ມນໍ້າກ້ອກທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂ້າເຊື້ອໂຣກເທື່ອ
ຫ້າມໃຊ້ນໍ້າກ້ອນຫຼືນໍ້າດື່ມທີ່ໃຊ້ນໍ້າກ້ອກເຮັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂ້າເຊື້ອໂຣກເທື່ອ
ຫຼືຫ້າມກິນອາຫານດິບທີ່ໃຊ້ນໍ້າກ້ອກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊື້ອໂຣກລ້າງ.
- ການຂ້າເຊື້ອໂຣກ: ຕົ້ມນໍ້າໃຫ້ຟົດນຶ່ງນາທີ. ເມື່ອເຢັນແລ້ວ ໃຫ້ເອົາໃສ່ໃນພາຊະນະທີ່ສະອາດແລ້ວເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ.
- ຂວດນໍ້າທີ່ມີຝາປິດແໜ້ນ ແມ່ນປອດພັຍທີ່ຈະດື່ມໄດ້. ນໍ້າກ້ອກທໍາມະດາ
ແມ່ນປອດພັຍທີ່ຈະໃຊ້ອາບແລະໃຊ້ຊັກເຄື່ອງໄດ້. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນນໍ້າທີ່ອາບຫຼືອົມຜ້າຖູໂຕ.
- ຕິດຕາມຂ່າວທາງວິທະຍຸ ທາງໂທລະທັດ ແລະ SPU [website](#) ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສຸກເສີນ
ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າຄໍາປະກາດເຕືອນນັ້ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກແລະນໍ້າປອດພັຍສໍາລັບດື່ມແລ້ວບໍ່.
- ຖ້າວ່າທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຍິນຂ່າວສານນີ້ ໃຫ້ທ່ານບອກເຂົາເຈົ້າຕໍ່.

ຫຼັງຈາກຄໍາປະກາດເຕືອນໃຫ້ຕົ້ມນໍ້າຖືກຍົກເລີກ:

- ປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າໄຫຼຈາກທໍ່ນໍ້າປະປາແລະກ້ອກນໍ້າ: ປ່ອຍໃຫ້ນໍ້າເຢັນໄຫຼອອກຈາກແຕ່ລະກ້ອກນໍ້າເປັນເວລາ 3 ນາທີ
ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກ້ອກນໍ້ານັ້ນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ສຸດທ້າຍ.
- ຊໍາລະເຄື່ອງເຮັດນໍ້າກ້ອນໂອໂຕແມຕິກ: ເຮັດນໍ້າກ້ອນສາມເທື່ອ ແລ້ວເອົາຖິ້ມທັງສາມເທື່ອ.
- ລະບາຍແລະຕົ້ມນໍ້າໃສ່ໃນເຄື່ອງເຮັດນໍ້າຮ້ອນອີກເທື່ອໃໝ່ ຖ້າວ່າທ່ານຕັ້ງອຸນຫະພູມສໍາລັບເຄື່ອງນັ້ນໃຫ້ຕໍ່າກ່ວາ 113
ອົງສາ ຟາເຣນຮາຍ.
- ເປີດ water softeners(ເຄື່ອງຜລິດນໍ້າອ່ອນ) ໂດຍໃຊ້ regeneration cycle(ລະບົບໝູນວຽນໃໝ່)
- ລະບາຍກ້ອກນໍ້າກິນ: ເປີດນໍ້າກ້ອກໃຫ້ນໍ້າໄຫຼ ເປັນເວລາສາມນາທີຕິດຕໍ່ກັນ.
- ລະບາຍນໍ້າອອກຈາກ water coolers(ເຄື່ອງເຮັດນໍ້າເຢັນ): ເປີດ coolers ໃຫ້ນໍ້າໄຫຼອອກມາ ໂດຍໃຊ້ direct
water connection(ສາຍຕໍ່ນໍ້າໂດຍຕົງ) ເປັນເວລາ 5 ນາທີ.

ສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

<http://www.seattle.gov/util/>

<http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/preparedness/disaster/BoilOrder.aspx>

http://www.cdc.gov/parasites/crypto/health_professionals/bwa/public.html